

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA EXAMES ENDOSCÓPICOS

### Situações especiais - Diabetes Mellitus

#### SE TOMA MEDICAÇÃO ANTIDIABÉTICA INJETÁVEL OU PARA EMAGRECIMENTO DO GRUPO DOS ANÁLOGOS DO GLP-1

Deverá proceder da seguinte forma:

- **Formulações de toma diária:** suspender a toma no próprio dia do exame (Semaglutido oral - Rybelsus®; Liraglutido - Victoza®, Saxenda®; Exenatido – Byetta®).
- **Formulações de toma semanal:** não administrar a toma 1 semana antes do exame. Quando a indicação é para perder peso, não administrar as tomas nas 2 semanas antes do exame (Semaglutido SC - Ozempic®, Wegovy®; Dulaglutido - Trulicity®; Exenatido de libertação prolongada - Bydureon®; Tirzepatida - Mounjaro®).

#### SE TOMA MEDICAÇÃO ANTIDIABÉTICA INIBIDORA DA SGLT-2 (COMPRIMIDOS)

Deverá:

- **Suspender 3 dias antes** (Canagliflozina - Invokana®, em associação Vokanamet®; Dapagliflozina - Forxiga®, Edistride®, em associação XigDuo®, Ebymect®, Qtern®; Empagliflozina – Jardiance®, em associação Glyxambi®, Synjardy®).

#### SE TOMA OUTROS ANTIDIABÉTICOS ORAIS (COMPRIMIDOS)

- Na **véspera do exame**, tome apenas metade da dose habitual de antidiabéticos orais, antes ou ao pequeno-almoço. Não tome mais medicação para a diabetes ao longo do dia.
- Faça a preparação intestinal conforme indicado nos folhetos próprios.
- Se tiver sintomas de hipoglicemia (suores, trémulo, visão turva, sensação de desmaio), efetue uma pesquisa de glicemia.
- Se a glicemia for inferior a 60 mg/dL, beba água com dois pacotes de açúcar e repita a pesquisa de glicemia após 30 minutos.
- Se não puder efetuar a pesquisa de glicemia, na presença dos sintomas referidos, beba igualmente água com dois pacotes de açúcar.
- No **dia do exame**, não tome nenhum antidiabético oral.
- **Após o exame**, retome a alimentação e a medicação, na dose e horário habituais.

#### SE TOMA INSULINA

- Na **véspera do exame**, tome apenas metade da dose habitual de insulina da manhã ou antes do pequeno-almoço. Não tome insulina habitual antes do almoço, lanche, jantar ou ceia.
- Pesquise a glicemia de 6 em 6 horas. Proceda de acordo com o seguinte esquema de valor de glicemia:
  - **Inferior a 80 mg/dL**, beba água com dois pacotes de açúcar e repita a pesquisa de glicemia após 30 minutos.
  - **80 e 159 mg/dL**, não administre insulina rápida (Actrapid, Regular, Rapid, Humalog, Novorapid).
  - **160 e 199 mg/dL**, administre 2 unidades de insulina rápida.
  - **200 e 249 mg/dL**, administre 3 unidades de insulina rápida.
  - **250 e 299 mg/dL**, administre 4 unidades de insulina rápida.
  - **300 e 349 mg/dL**, administre 5 unidades de insulina rápida.
  - **350 e 399 mg/dL**, administre 6 unidades de insulina rápida.
  - **Superior a 400 mg/dL**, administre 8 unidades de insulina rápida.
- No **dia do exame**, não administre insulina de manhã.
- Mantenha pesquisa de glicemia de 6 em 6 horas e o esquema de insulina rápida.
- **Após o exame**, retome a alimentação e a insulina na dose habitual.